



Prof.

**Mauro Cervigni**

**UROLOGO GINECOLOGO**

# **PROLASSO VESCICALE: 5 SEGNALI CHE È DA OPERARE**

[maurocervigni.it](http://maurocervigni.it)

# INDICE

Introduzione	1
Sensazione di peso o pressione nella zona pelvica	2
Sensazione di un corpo estraneo o bruciore	3
Problemi nella minzione	3
Comparsa di cistiti	4
Dolore durante i rapporti sessuali	4
Conclusioni	5



# **Prolasso vescicale: 5 segnali che è da operare**

Il prollasso della vescica avviene quando la vescica, che è normalmente posizionata all'interno del bacino femminile, fuoriesce per varie cause tra cui la principale è la gravidanza. Le gravidanze infatti sono un momento estremamente importante per la donna ma che chiaramente creano uno stiramento dei tessuti e degli organi e di cui la vescica è l'organo principale che ne risente maggiormente.

Di seguito sono elencati cinque segnali che potrebbero indicare la necessità di un intervento chirurgico per il prollasso vescicale.



**1.**

# **Sensazione di peso o pressione nella zona pelvica**

Uno dei sintomi più comuni del prolasso vescicale è la sensazione di peso o pressione nella zona pelvica.

Può sembrare che ci sia qualcosa che spinge verso il basso o che qualcosa sia fuori posto nella vagina.

Questa sensazione può essere più evidente dopo sforzi fisici intensi o dopo aver trascorso molto tempo in piedi.



2.

## Sensazione di un corpo estraneo o bruciore

Può venire riportata la percezione della presenza di un corpo estraneo in **sede inguinale** oppure un senso di pesantezza o fastidio pelvico.

3.

## Problemi nella minzione

Il prolasso vescicale può influire sul corretto funzionamento della vescica. Potresti sperimentare problemi come difficoltà a svuotare completamente la vescica, bisogno frequente di urinare, incontinenza urinaria o perdite involontarie di urina. Questi sintomi possono indicare un prolasso significativo della vescica che richiede un trattamento chirurgico



4.

## Comparsa di **cistiti**

I problemi della minzione causati dal prolasso vescicale e/o genitale descritti al punto 3, possono causare anche cistiti batteriche che tendono a ripresentarsi ciclicamente nonostante la terapia antibiotica

5.

## **Dolore** durante i rapporti sessuali

Il prolasso vescicale può causare dolore durante i rapporti sessuali, noto come dispareunia. La vescica spostata può provocare un'irritazione o una pressione eccessiva durante l'attività sessuale, rendendo i rapporti dolorosi o scomodi.ale e/o genitale descritti al punto 3, possono causare anche cistiti batteriche che tendono a ripresentarsi ciclicamente nonostante la terapia antibiotica



# Conclusioni

Se hai sperimentato uno o più dei segnali descritti sopra, è consigliabile consultare un medico specialista in ginecologia. L'esame clinico e altri test diagnostici possono aiutare a determinare la gravità del prolasso vescicale e a valutare la necessità di un intervento chirurgico o capire la necessità di un trattamento che può essere all'inizio un trattamento assolutamente conservativo. Il trattamento conservativo potrebbe prevedere ad esempio fare degli esercizi di rafforzamento della muscolatura del pavimento pelvico o fare delle stimolazioni elettriche che permettano la contrazione della muscolatura del pavimento e far sì che la vescica rientri nella sua normale posizione anatomica. Nel caso la situazione sia ancora più avanzata, si decide per un intervento chirurgico riparativo.

**Prenota un consulto con il Prof. Cervigni, medico chirurgo specialista in Urologia e Ginecologia [premendo qui](#).**





Prof.

**Mauro Cervigni**

**UROLOGO GINECOLOGO**

[maurocervigni.it](http://maurocervigni.it)